

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

**Kanamycin-POS**  
6,2 mg/ml  
**oční kapky, roztok**  
(kanamycini sulfas)

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

### **Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je Kanamycin-POS, oční kapky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kanamycin-POS, oční kapky používat
3. Jak se Kanamycin-POS, oční kapky používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Kanamycin-POS, oční kapky uchovávat
6. Obsah balení a další informace

### **1. CO JE KANAMYCIN-POS, OČNÍ KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Kanamycin-POS jsou oční kapky s protibakteriálním účinkem.

Přípravek slouží k místnímu léčení bakteriálních infekcí víček, spojivek a rohovky, při poranění, popálení nebo poleptání oka a po očních operacích.

Přípravek Kanamycin-POS, oční kapky je určen dospělým, dospívajícím a dětem.

### **2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KANAMYCIN-POS, OČNÍ KAPKY POUŽÍVAT**

Nepoužívejte přípravek Kanamycin-POS, oční kapky

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Je třeba mít na zřeteli možnost zkřížené alergie s jinými aminoglykosidovými antibiotiky.

### **Upozornění a opatření**

Před použitím přípravku Kanamycin-POS, oční kapky se poradte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatření při použití přípravku Kanamycin-POS, oční kapky je zapotřebí při používání kontaktních čoček. Pokud nosíte kontaktní čočky, musíte je před nakapáním přípravku do oka vyjmout. Nasadte je, prosím, až za 15 – 20 minut po vkápnutí.

### **Další léčivé přípravky a přípravek Kanamycin-POS, oční kapky**

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Kanamycin-POS, oční kapky a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s používáním přípravku Kanamycin-POS, oční kapky užívat nějaký dostupný lék bez lékařského předpisu, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Při místním léčení doporučenými dávkami se interakce s jinými léky nedají očekávat.

### **Přípravek Kanamycin-POS, oční kapky s jídlem a pitím**

Přípravek Kanamycin-POS, oční kapky se může používat nezávisle na jídle.

### **Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Kanamycin-POS, oční kapky se v těhotenství i v období kojení může používat, při místním očním použití nebyly celkové toxické účinky prokázány.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Pro možnost krátkodobého přetrvávání mírně rozmazaného vidění nevykonávejte tyto činnosti po dobu asi 20 minut po nakapání přípravku Kanamycin-POS, oční kapky do oka.

## **3. JAK SE KANAMYCIN-POS, OČNÍ KAPKY POUŽÍVÁ**

Vždy používejte Kanamycin-POS, oční kapky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je, pokud lékař nepředepsal jinak, jedna kapka do spojivkového vaku postiženého oka (v pravidelných intervalech každé 2 – 3 hodiny, pouze přes den).

Trvání léčby určí vždycky lékař, který na základě pravidelných kontrol v závislosti na průběhu onemocnění rozhodne o pokračování nebo ukončení léčby.

Za normálních okolností infekce po 5-7 dnech odezní, poté má léčba pokračovat ještě 2-3 dny.

Trvání léčby smí překročit 14 dní jen v odůvodněných případech.

Odšroubujte pojistný uzávěr, který kryje kapací lahvičku, zakloňte hlavu, odtáhněte dolní víčko od oka a pak mírným tlakem na lahvičku vkápněte do spojivkového vaku jednu kapku. Pak oči pomalu zavřete.

Přípravek zásadně používejte tak, aby hrot kapací lahvičky nepřišel do styku s okem.

### **Jestliže jste použil(a) více přípravku Kanamycin-POS, oční kapky, než jste měl(a)**

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

### **Jestliže jste zapomněl(a) použít Kanamycin-POS, oční kapky**

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

### **Jestliže jste přestal(a) používat Kanamycin-POS, oční kapky**

Předtím, než se z vlastní vůle rozhodnete přestat používat Kanamycin-POS oční kapky, měla(a) byste vzít v úvahu, že vaše potíže mohou zesílit, nebo se znovu objevit. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

#### 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Kanamycin-POS oční kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:	≥ 1/10
Časté:	≥ 1/100 až < 1/10
Méně časté:	≥ 1/1000 až < 1/100
Vzácné:	≥ 1/10000 až < 1/1000
Velmi vzácné:	< 1/10000
Není známo:	z dostupných údajů nelze určit

Vzácně se mohou vyskytnout reakce přecitlivělosti - horečka, svědění, vyrážka, eosinofilie (zmnožení určitého typu bílých krvinek), angioneurotický edém (bolestivý otok kůže a sliznic), kontaktní dermatitida (zánětlivá kožní reakce) nebo kopřivka. Tyto změny vyžadují přerušování léčby. Může se vyvinout i odolnost (rezistence) dosud citlivých mikrobů proti přípravku anebo infekce rezistentními kmeny mikrobů.

#### Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10  
Webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

#### 5. JAK KANAMYCIN-POS OČNÍ KAPKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za "Použitelné do". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE**

### **Co Kanamycin-POS oční kapky obsahuje**

Léčivou látkou je kanamycini sulfas. Jeden ml roztoku obsahuje kanamycini sulfas 6,2 mg (odpovídá kanamycinum 5 mg) .

Pomocnými látkami jsou kyselina boritá, dekahydrát tetraboritanu sodného, voda na injekci.

### **Jak Kanamycin-POS oční kapky vypadá a co obsahuje toto balení**

Jedna kapací lahvička s obsahem 5 ml očních kapek.

### **Držitel rozhodnutí o registraci**

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468

e-mail: info@ursapharm.cz

### **Výrobce**

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Německo

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 12. 2016**