

## **Příbalová informace: informace pro pacienta**

Allergo-COMOD oční kapky  
Oční kapky, roztok  
(Dinatrii cromoglicas)

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

### **Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je Allergo-COMOD oční kapky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergo-COMOD oční kapky používat
3. Jak se Allergo-COMOD oční kapky používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Allergo-COMOD oční kapky uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### **1. Co je Allergo-COMOD oční kapky a k čemu se používá**

Přípravek Allergo-COMOD oční kapky je oftalmologikum, antialergikum.

V buňkách zabraňuje uvolňování látek, odpovědných za spuštění alergické reakce. Po podání do spojivkového vaku působí proti alergickému zánětu spojivek.

Používá se při akutním (prudkém) i chronickém zánětu spojivek, např. při zánětu spojivek doprovázejícím sennou rýmu, při tzv. "jarním" zánětu spojivek nebo alergickém zánětu spojivek a rohovky.

#### **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergo-COMOD oční kapky používat**

##### **Nepoužívejte Allergo-COMOD oční kapky**

pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

##### **Upozornění a opatření**

Před použitím přípravku Allergo-COMOD oční kapky se poradte se svým lékařem.

##### **Děti a dospívající**

Terapii dětí mladších 6 let je třeba pečlivě zvážit.

##### **Další léčivé přípravky a Allergo-COMOD oční kapky**

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat a pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí na kromoglykáty nebo jinou složku přípravku, informujte ho o tom rovněž.

##### **Allergo-COMOD oční kapky s jídlem a pitím**

Allergocrom oční kapky se může používat nezávisle na jídle.

### **Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**


Bezprostředně po nakapání do oka může přípravek vyvolat na krátkou dobu rozmazané vidění. Doporučuje se proto neřítit motorové vozidlo a neobsluhovat stroje po dobu 20 minut po aplikaci přípravku.

### **3. Jak se přípravek Allergo-COMOD oční kapky používá**

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Doporučená dávka přípravku je:

Pokud Vám lékař nepředepsal jinak vkápněte 4krát denně - s časovým odstupem nejméně 4 hodin – do spojivkového vaku obou očí po jedné kapce přípravku do každého oka. Pro dospělé i pro děti od 6 let platí stejné dávkování.

Před použitím je třeba sejmout ochrannou čepičku. Před prvním použitím se musí tolikrát zatlačit na dno plastické lahvičky, až z jejího hrotu vystoupí první kapka. Tím je lahvička připravena k dalšímu použití. Obráťte lahvičku hrotem dolů a zatlačte nepřerušovaným tlakem na dno lahvičky až na doraz. Tím aktivujete kapací mechanismus, který uvolní jednu kapku nezávisle na rychlosti a síle stlačení. Zakloňte mírně hlavu, jemně odtáhněte dolní víčko a naneste jednu kapku do dolního spojivkového vaku. Hrotem lahvičky se nesmíte dotknout spojivky. Oko pomalu zavřete. Po použití lahvičku otřete do sucha a pečlivě uzavřete.



**Jestliže jste použil(a) více přípravku Allergo-COMOD oční kapky, než jste měl(a)** poraďte se při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem s lékařem.

### **Jestliže jste zapomněl(a) použít Allergo-COMOD oční kapky**

nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

### **Jestliže jste přestal(a) používat Allergo-COMOD oční kapky**

z vlastní vůle, je nutné vzít v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit, zejména v případě, že jste stále ještě ve styku s alergizujícím vlivem! Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

### **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Allergo-COMOD oční kapky se obvykle dobře snáší. Vzácně může vyvolat pálení v očích, pocit cizího tělíska ve spojivkovém vaku, otok víčka a překrvení spojivky. Pokud tyto obtíže nastanou, většinou zanedlouho samy odezní.

### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10  
webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

### **5. Jak Allergo-COMOD oční kapky uchovávat**

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce i štítku na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

### **6. Obsah balení a další informace**

#### **Co přípravek Allergo-COMOD oční kapky obsahuje**

Léčivou látkou je: dinatrii cromoglicas (natrium-chromoglykát), 20 mg v 1 ml (cca 30 kapek).  
Pomocnými látkami jsou: dihydrát dinatrium-edetátu, sorbitol, voda na injekci.

#### **Jak přípravek Allergo-COMOD oční kapky vypadá a co obsahuje toto balení**

PE lahvička s obsahem 1 x 10 ml roztoku s dávkovačem kapek (COMOD systém) a víčkem, krabička.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

V kapací lahvičce přípravku Allergo-COMOD oční kapky je k použití zaručen obsah 10 ml.

Z výrobně-technických důvodů vždy zůstává v lahvičce i po úplném vypořádání přípravku malý zbytek kapaliny.

#### **Držitel rozhodnutí o registraci**

URSAPHARM spol. s r.o.  
Kubánské náměstí 1391/11  
100 00 Praha 10, Česká republika  
Tel.: +420 295 560 468  
e-mail: [info@ursapharm.cz](mailto:info@ursapharm.cz)

#### **Výrobce**

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrücken, Německo

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.7.2016**